



المملكة العربية السعودية  
وزارة الحرس الوطني - الشؤون الصحية  
قسم الأورام

[www.ngha.med.sa](http://www.ngha.med.sa)  
**2020**

## الثآليل التناسلية عند المرأة

### Genital warts

Oracle # 132604

HA. Printing Press 17 / 1141

## أسباب الثاليل التناسلية:

### What is Genital Warts :

تظهر الثاليل التناسلية نتيجة عدوى فيروسية تُعد الأكثر شيوعاً بالجهاز التناسلي.

## الأعراض

### Symptoms of Genital Warts:

١. ظهور ثاليل مرتفعة أو في مستوى سطح الجلد في الأعضاء التناسلية للجنسين.
٢. وجود حكة في منطقة الشرج، أو الشفتين.
٣. وجود إفرازات مهبلية زائدة.
٤. نزيف مهبلي بعد الجماع.

أماكن الإصابة بالثاليل في السيدات هي:

الشفتين، فتحة المهبل ، جدار المهبل، عنق الرحم، حول الشرج.

## تشخيص الثاليل التنaslية:

### Diagnosis of Genital Warts:

أثناء الكشف الطبي يمكن التعرف بسهولة على المرض إذا كانت الثاليل موجودة في الأعضاء التناسلية الخارجية. أما إذا كانت صغيرة جداً في الحجم وغير مرئية بالعين المجردة فيمكن رؤيتها بوضوح عند استخدام عدسة مكبرة.

## طرق علاج الثاليل:

### Treatment of Genital Warts:

يتم اختيار الطريقة المناسبة تبعاً لعدة عوامل منها حدة المرض ومكان ظهور الثاليل.  
يجب التأكد من علاج الزوج والزوجة معاً وليس أحدهما فقط.

#### ١. العلاج الدوائي:

يتم العلاج الدوائي باستخدام الأدوية.

#### ٢. إزالته عن طريق:

- التجميد بسائل نيتروجيني.
- الكي الكهربائي.
- الليزر.

#### ٣. العلاج الجراحي باستئصال الثاليل.

## بعد العلاج:

### After treatment:

بعد استئصال الثاليل قد يستمر وجود الفيروس عند المريض، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الإصابة بالثاليل مرة أخرى، لذلك يجب المتابعة المستمرة مع الطبيب حتى إذا بدا للمريض اختفاء الثاليل نهائياً.