




المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني - الشؤون الصحية
قسم الأورام

منظار عنق الرحم Colposcopy

www.ngha.med.sa
2020



Oracle # 132613

HA. Printing Press 17 / 1140

قد تشعر المريضة ببعض المغص الخفيف أو القرص أثناء أخذ العينة ويساعدها كثيراً الاسترخاء وأخذ نفساً عميقاً أثناء قيام الطبيب بالفحص.

بعض الأعراض المتوقع حدوثها بعد عملية الفحص :

- إفرازات بنية اللون قد تستمر لعدة أيام ويمكن معالجتها بسهولة من قبل الطبيب المعالج.

المضاعفات المحتملة بعد الفحص:

Complications of Colposcopy:

- ١. مغص خفيف في البطن.
- ٢. نزيف الدم في حال أخذ عينات من عنق الرحم، وفي حالة استمراره يرجى إبلاغ الطبيب المعالج أو زيارة الطوارئ.

يجب عليك:

- اتباع تعليمات الطبيب فيما يخص العلاقة الزوجية.
- إخبار الطبيب المعالج في حالة الحمل.
- تستغرق نتيجة الفحص حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد عمل المناظار.

منظار عنق الرحم:

Colposcopy:

منظار عنق الرحم عبارة عن جهاز يشبه المايكروسكوب يستخدمه الطبيب المعالج لفحص عنق الرحم بصورة مباشرة وهو إجراء بسيط وغير مؤلم، يستغرق حوالي ١٥ دقيقة .

يقوم الطبيب بعمل هذا الفحص في حالة:

Why it is Done:

- ٠ ظهور عنق الرحم بشكل غير طبيعي أثناء الفحص النسائي.
- ٠ ظهور نتائج غير طبيعية لمسحة عنق الرحم والتي قد تكون:
 - ١- تغير في الأنسجة أو الخلايا.
 - ٢- وجود دلائل على وجود فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

طريقة إجراء الفحص:

Colposcopy Procedure:

تستلقي المريضة في وضع الفحص النسائي ويقوم الطبيب بفحص المهبل وعنق الرحم بالمنظار مع استخدام مواد خاصة لتحديد المناطق الغير طبيعية حيث تظهر المناطق المصابة بلون مختلف عن الأنسجة الأخرى، وبمجرد ظهور هذه المناطق تؤخذ عينة منها وترسل للفحص في المختبر.